

Because we care for your birds

ESB PLUS

POUDRE HYDROSOLUBLE 100 GRAMMES

TRAITEMENT DE LA COCCIDIOSE

La **coccidiose** est une maladie infectieuse causée par des protozoaires (petits parasites unicellulaires). Le développement se fait dans les **cellules intestinales** de l'hôte, endommageant la paroi intestinale. La digestion est alors fortement entravée et les oiseaux maigrissent. Les oisillons sont très sensibles ! L'**atoxoplasmose** est également une forme particulière de coccidiose. Ce parasite pénètre **dans la circulation sanguine** au cours de son cycle et peut s'installer dans des organes tels que le foie, la rate, les poumons et le cerveau. Les oiseaux présentent un foie épais, des taches sanglantes sur les intestins, une respiration crépitante et parfois des troubles de l'équilibre. **ESB PLUS** agit sur le cycle de la coccidiose et empêche son développement. Il s'agit donc d'un coccidiostatique, qui interrompt le cycle. Il n'a aucun effet négatif sur la fécondation, la ponte, la croissance ou l'éclosion.



INDICATIONS

- Traitement préventif avant le début de l'élevage.
- Traitement de l'infection par la coccidiose.
- Contrôle de l'atoxoplasmose (Lankesterella).
- Protection préventive pendant la période de mue.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Administration orale par l'eau de boisson

- *En cas de coccidiose* : résoudre 2 g par litre d'eau de boisson pendant 2 x 5 jours avec 2 jours de repos entre les deux. Ce traitement peut être répété de la même manière après 2 semaines.
- *En cas d'atoxoplasmose* : résoudre 1 g par litre d'eau de boisson pendant 4 périodes de 5 jours avec 2 jours de repos entre chaque période.

Changer l'eau médicinale quotidiennement et fournir comme la seule source d'eau de boisson pendant le traitement.
Chaque boîte contient une mesurette de 8 grammes.

Commander par :



www.giantel.nl/vogelproducten/
Distributeur pour
Belgique - Pays-Bas.



www.pantex-coutteel.com
autres pays.

