

Because we care for your birds

PANTACOX

WATEROPLOSBAARE VLOEISTOF 100 ML

COCCIDIOSE BEHANDELING

Coccidiose is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door protozoa (kleine ééncellige parasieten). De ontwikkeling vindt plaats **in de darmcellen** van de gastheer waardoor de darmwand beschadigd wordt. Hierdoor wordt de vertering erg belemmerd en vermageren de vogels. Jonge vogels zijn zeer gevoelig!

Atoxoplasmose is ook een bepaalde vorm van coccidiose. Deze parasiet komt tijdens zijn cyclus **in de bloedbaan** terecht en kan zich in organen zoals lever, milt, longen en hersenen nestelen. Vogels vertonen een dikke lever, bloederige haarden op de darmen, maken een krakende ademhaling en hebben soms evenwichtsstoornissen.

Pantacox grijpt in op de cyclus van coccidiën en heeft daar een afdodende werking. Het is dus een coccidiocide. Het heeft geen negatieve gevolgen voor bevruchting, leg, groei of broeduitkomsten.



INDICATIES

- Preventieve behandeling voor de aanvang van de kweek.
- Behandeling van een coccidiose besmetting.
- Controle van atoxoplasmose (Lankesterella).
- Preventieve bescherming tijdens de rui periode.

DOSERING EN TOEDIENING

Oraal toedienen via het drinkwater

- *Bij coccidiose*: 2 à 3 ml per liter drinkwater gedurende 2 à 3 opeenvolgende dagen. Indien nodig de behandeling na 2 weken herhalen.
- *Bij atoxoplasmose*: 2 à 3 ml per liter drinkwater gedurende 2 opeenvolgende dagen en daarna verder behandelen met ESB PLUS.

Ververs het gemediceerde water dagelijks en geef het als enige bron van drinkwater voor de duur van de behandeling. In de rustperiodes kunnen extra vitamines verstrekt worden.

Elke verpakking bevat een spuitje van 1 ml.

Bestellen via verdeler van
Pantex-Coutteel producten
binnen Nederland en België.

Giantel BV | info@giantel.nl | +31 (0)497-644555



WWW.PANTEX-COUTTEEL.COM

